

1. Grundlegende Aufgaben

1.1. Richten Sie zuerst die Reaktionsgleichung ein. Berechnen Sie anschließend anhand der gegebenen Stoffmenge, die Stoffmengen der anderen gebildeten bzw. verbrauchten Reaktionspartner.

Beispiel	Ca_3P_2	+	6 H_2O	→	3 $\text{Ca}(\text{OH})_2$	+	2 PH_3
	0,8 mol		4,8 mol		2,4 mol		1,6 mol
<p>Aus dem Koeffizientenverhältnis 6:3 folgt, dass die doppelte Menge H_2O verbraucht wird, wie $\text{Ca}(\text{OH})_2$ entsteht, d.h. 4,8 mol. Aus dem 1:3-Koeffizientenverhältnis ($\text{Ca}_3\text{P}_2 : 3 \text{Ca}(\text{OH})_2$), folgt dass 3 mal mehr $\text{Ca}(\text{OH})_2$ gebildet wird, wie Ca_3P_2 verbraucht wird. Mit anderen Worten: Es wird 1 Drittel der $\text{Ca}(\text{OH})_2$-Stoffmenge benötigt, d.h. 0,8 mol. Aus dem Koeffizientenverhältnis 3:2 folgt, dass 1,6 mol PH_3 gebildet werden, wenn 2,4 mol $\text{Ca}(\text{OH})_2$ entstehen.</p>							
a)	Na_2O_2			→	Na_2O	+	O_2
	1 mol						
b)	NaHCO_3			→	Na_2CO_3	+	CO_2
					0,5 mol	+	H_2O
c)	N_2O	+	H_2	→	N_2H_4	+	H_2O
			0,75 mol				
d)	Cu_2S	+	Cu_2O	→	SO_2	+	Cu
							0,9 mol
e)	H_2O	+	CO_2	→	CH_4	+	O_2
	0,654 mol						
f)	Al_4C_3	+	H_2O	→	$\text{Al}(\text{OH})_3$	+	CH_4
			1,15 mol				

1.2. a) Welche Masse Natrium und welches Volumen Cl_2 -Gas ($p = 1013 \text{ hPa}$, $\vartheta = 20 \text{ }^\circ\text{C}$) müssen zur Synthese von 10 g NaCl eingesetzt werden? Anm.: 1 mol eines Gases nimmt bei $20 \text{ }^\circ\text{C}$ und 1013 hPa $24,06 \text{ L}$ ein.

b) Welche Auswirkung hat es auf die NaCl -Masse, wenn 12,5% mehr Na als berechnet eingesetzt werden?

1.3. Berechnen Sie die Volumina an H_2 und O_2 ($p = 1013 \text{ hPa}$, $\vartheta = 20 \text{ }^\circ\text{C}$) um 50 mL flüssiges Wasser herzustellen. ($\rho = 1,0 \text{ g/cm}^3$). Anm.: 1 mol eines Gases nimmt bei $20 \text{ }^\circ\text{C}$ und 1013 hPa $24,06 \text{ L}$ ein.

1.4. Calciumcarbonat (CaCO_3) reagiert in Salzsäure (HCl) zu CaCl_2 , H_2O und CO_2 . Berechnen Sie die Masse von CaCl_2 und H_2O sowie das Gasvolumen von CO_2 , wenn $0,291 \text{ g}$ CaCO_3 eingesetzt werden. Hinweis: Gehen Sie auch hier wie bei Aufgabe Nr. 3 wieder davon aus, dass das molare Volumen von Gasen bei den Reaktionsbedingungen $24,06 \text{ Liter}$ pro mol beträgt.

1.5. Welche Masse Schwefel lässt sich aus 20 g FeS gewinnen?

1.6. Bei der Reaktion von Bariumhydroxid ($\text{Ba}(\text{OH})_2$) mit CO_2 entstehen Bariumcarbonat (BaCO_3) und Wasser. Man lässt 10 g $\text{Ba}(\text{OH})_2$ mit einem Überschuss an CO_2 reagieren. Berechnen Sie die Masse $m(\text{BaCO}_3)$.

1.7. In Raketen mit Flüssigtreibstoff nutzt man Hydrazin (N_2H_4) und N_2O_4 (Distickstofftetraoxid) als Treibstoffkomponenten. Werden beide Komponenten zusammen gebracht, so zünden sie spontan, d.h. ohne Zündquelle (**hypergol**er Treibstoff). Bei der Reaktion entsteht Stickstoff und Wasser. Welche Masse an Stickstoff und H_2O entstehen pro kg Hydrazin? In welchem Massenverhältnis müssen die Ausgangsstoffe in der Raketendüse zusammengebracht werden?

1.8 Innerhalb von 50 Minuten entstehen bei der Gärung von Glucose ($\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$) die Produkte Ethanol ($\text{C}_2\text{H}_6\text{O}$) und $50 \text{ cm}^3 \text{ CO}_2$. Berechnen Sie die Umsatzgeschwindigkeit der Glucose in der Einheit mg/min . Hinweis: Das molare Volumen beträgt bei den gegebenen Bedingungen $36,0 \text{ L/mol}$. (ähnlich einer regelmäßig wiederkehrenden Prüfungsaufgabe Abschlussprüfung Teil 1).

2. Weitere Aufgaben zum Einrichten von Reaktionsgleichungen und Umsatzberechnungen

- *Viele dieser Aufgaben sind ehemalige Aufgaben aus Klassenarbeiten.*
- *Sie bekommen hier sehr viele Aufgaben zur Übung. Wie viele Sie zur Vorbereitung auf die Klassenarbeit lösen, bleibt Ihnen überlassen. Die mit „**“ markierten Aufgaben sind etwas schwieriger. In der Regel enthält eine Klassenarbeiten auch eine Aufgaben von diesem Kaliber.*

2.1. Geben Sie die richtig eingerichteten Reaktionsgleichungen an:

- Aluminiumsulfat ($\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$) wird durch Umsetzung von Aluminiumhydroxid ($\text{Al}(\text{OH})_3$) mit konzentrierter Schwefelsäure (H_2SO_4) gewonnen. Dabei entsteht auch Wasser.
- Calciumcyanamid (CaCN_2) setzt sich mit Wasser zu Calciumcarbonat (CaCO_3) und Ammoniak (NH_3) um.
- Aus Bleinitrat ($\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$) entsteht beim Erhitzen Bleioxid (PbO), Stickstoffdioxid (NO_2) und Sauerstoff (O_2).

2.2. Ethanol ($\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$) verbrennt an der Luft zu Kohlenstoffdioxid und Wasser.

- (Geben Sie ein Energie-Reaktionsweg-Diagramm (Energiediagramm) der Reaktion an und beschriften Sie markante Punkte.) NUR, WENN IM MEINEM UNTERRICHT BEHANDELT
- (Die Reaktion lässt sich auch mit einem *Katalysator* durchführen. Worin besteht der Nutzen eines solchen Stoffs und wie lässt sich seine Wirkung erklären?) NUR, WENN IM MEINEM UNTERRICHT BEHANDELT
- Welche Masse Ethanol müssen verbrennt werden, damit 1000 Liter Kohlenstoffdioxid entstehen? Hinweis: Bei den gegebenen Bedingungen, nehmen 1 mol eines Gases 26,3 Liter ein.

2.3. Durch Einleiten von CO_2 in eine KOH -Lösung entsteht Kaliumcarbonat (K_2CO_3) und H_2O . Welche Masse K_2CO_3 entsteht, wenn 20 g CO_2 in einen Überschuss an KOH -Lösung eingeleitet werden?

2.4. Eisen (Fe) reagiert mit Sauerstoff (O_2) zu Eisenoxid (Fe_2O_3). Welche Masse Sauerstoff wird benötigt, um 50 Gramm Eisenoxid zu bilden?

2.5. Bei der Verbrennung von Propan (C_3H_8) mit Luftsauerstoff (O_2) entsteht CO_2 und H_2O . Welche Masse an CO_2 und an H_2O werden gebildet, wenn 170 Gramm Propan (Inhalt einer Campinggaskartusche) verbrannt werden?

2.6. Auch Ihre Körperzellen veratmen Zucker ($\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$) mit Luftsauerstoff zu Kohlenstoffdioxid und H_2O . Das H_2O scheiden Sie größtenteils über die Nieren aus, das CO_2 atmen Sie aus. Wie viel Liter reines CO_2 werden ausgeatmet, wenn Ihre Zellen am Tag 500 g Zucker veratmen? Hinweis: Unter den gegebenen Bedingungen nimmt ein mol eines beliebigen Gases das Volumen von 22,4 L ein, d.h. das molare Volumen des Gases beträgt $V_m = 22,4 \text{ L/mol}$.

2.7. Bei sehr hohen Temperaturen können aus Kohlenstoff (C) und Wasserdampf die gasförmigen Produkte Kohlenstoffmonoxid (CO) und Wasserstoff (H_2) gewonnen werden. Welches Gesamtvolumen an Gas entsteht, wenn man 5 g Kohlenstoff umsetzt. Hinweis: Unter den gegebenen Bedingungen nimmt ein mol eines beliebigen Gases das Volumen von 88,9 L ein. $V_m = 88,9 \text{ L/mol}$

2.8. 5,00 Gramm Eisensulfid (FeS_2) werden mit Sauerstoff (O_2) zu Fe_2O_3 und Schwefeldioxid (SO_2) verbrannt. Welches Sauerstoffvolumen wird dabei verbraucht und welche Masse Fe_2O_3 wird gebildet? Hinweis: 1 mol eines Gases nimmt bei den gegebenen Bedingungen 28,45 L ein. ($V_m = 28,45 \text{ L/mol}$)

2.9.* In ein leeres Stahlgefäß werden 10,0 Gramm Aluminium (Al) und 10,0 mL flüssiges Brom (Br_2 , $\rho = 3,12 \text{ g/cm}^3$) eingelassen und fest verschlossen. Bei der Reaktion entsteht Aluminiumbromid (AlBr_3). Geben Sie alle nach Reaktionsende enthaltenen Stoffe (incl. der jeweiligen Masse) an.

2.10.* 10 Liter Methan (CH_4) werden mit 5 Liter Sauerstoff (O_2) in einem Reaktionsgefäß zu CO_2 und H_2O (g) umgesetzt. Welche Massen und welche Volumina der beteiligten Stoffe sind nach Reaktionsende im Gefäß enthalten, wenn auch H_2O am Ende gasförmig vorliegt? Hinweis: 1 mol Gas entspricht einem Volumen von 22,4 L

Musterlösungen und ein weiterer Abschnitt (3.) mit weiteren Übungsaufgaben finden sich unter www.laborberufe.de

3. Aufgabenüberschuss und Zusatzaufgaben zum weiteren üben (viele davon sind ehemalige Klassenarbeitsfragen)

3.1 Pflanzen stellen aus Kohlenstoffdioxid (CO_2) und Wasser in der Fotosynthese Glucose ($\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$) und Sauerstoff (O_2) her.

- a) Notieren Sie die Reaktionsgleichung.
- b) Welche Masse CO_2 muss die Pflanze umsetzen, um 1000 g Glucose zu bilden? Welches Volumen Sauerstoff bildet sich dabei. Hinweis: Bei den gegebenen Bedingungen, beträgt das molare Volumen eines Gases 23,5 L/mol, .d.h. ein mol eines Gases nimmt 23,5 L ein.

3.2 Wie alle unedlen Metalle, löst sich Aluminium in Salzsäure (HCl) unter Bildung von Wasserstoff (H_2) auf. Dabei bildet sich auch Aluminiumchlorid (AlCl_3). Welche Masse Aluminium und HCl muss eingesetzt werden, um 20 g AlCl_3 zu erhalten?

3.3 Mit Kohlenstoffmonoxid (CO) kann Eisen(III)-oxid (Fe_2O_3) zu Eisen (Fe) reagieren, wobei auch Kohlenstoffdioxid entsteht. Wie viel Liter Kohlenstoffmonoxid und welche Masse Eisen(III)-oxid werden zur Herstellung von 1 Tonne Eisen benötigt, wenn man von 100%igem Stoffumsatz ausgeht?

3.4 In ein Reaktionsgefäß werden 2 g Gramm Iod (I_2) mit 2 Liter Wasserstoff (H_2) zur Reaktion gebracht, wobei sich gasförmiges Iodwasserstoff (HI) bildet. Welche Stoffmengen (in mol) der drei Stoffe sind nach Reaktionsende enthalten? Hinweis: Das molare Volumen eines Gases beträgt bei den gegebenen Bedingungen 22,4 Liter pro mol.

3.5 Natriumchlorid (NaCl) kann mit Schwefelsäure (H_2SO_4) zu Natriumsulfat (Na_2SO_4) zu Chlorwasserstoff (HCl) umgesetzt werden. Welche Masse Chlorwasserstoff und Natriumsulfat entstehen bei der Umsetzung von 50 g Natriumchlorid? (*ähnlich einer Aufgabe aus Abschlussprüfung Teil 1 für CBL, Sommer 2007*).

kommentierte Lösungen unter www.laborberufe.de

Nicht zu früh in den Musterlösungen nachschauen! Wenn Sie nicht weiterkommen, dann lesen Sie hier erst mal die Tipps. Erst wenn die auch nicht weiterhelfen, können Sie einen Blick in die Musterlösungen werfen. Sie finden die Lösungen auf den folgenden Seiten.

Hier handelt es sich um einen möglichen Lösungsweg. Es gibt auch andere Lösungswege die zielführend sind. Wichtig für die Bewertung ist, dass der gesamte Lösungsweg nachvollzogen werden kann. Bei jeder Rechnung muss ersichtlich sein, was hier gerade berechnet werden soll. Dies kann z.B. in Textform angegeben werden. Alle Einheiten sind ausnahmslos anzugeben. Endergebnisse müssen auf eine vernünftige Anzahl an Nachkommastellen gerundet werden. Ist die Anzahl der Nachkommastellen offensichtlich unvernünftig, gibt es einen Punktabzug.

Wenn Sie irgendwelche Fehler in den Musterlösungen finden, bitte ich um einen kurzen Hinweis per Mail dankbar:

info@laborberufe.de

Allgemeines Lösungsmuster, das für die meisten Umsatzberechnungen gilt.

Schritt 1: Alle Ausgangsstoffe und Produkte der Reaktion durch ein Pfeil getrennt notieren. Ausgangsstoffe -> Produkte. Dabei keine Stoffe vergessen, auf die nur indirekt hingewiesen wird. **Beispiel:** „Wasserstoff verbrennt an der Luft zu Wasser“) => $\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow \text{H}_2\text{O}$ („Verbrennung an der Luft“ meint eine exotherme Reaktion mit O_2 unter Flammeneerscheinung, auch wenn im Text *Sauerstoff* nicht als Wort erwähnt ist.

Schritt 2: Reaktionsgleichung einrichten: Die Anzahl der Atome muss für jedes Element rechts und links des Pfeils gleich sein. **Beispiel:** $2 \text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2 \text{H}_2\text{O}$

Schritt 3: Die gegebene Stoffmenge aus der Aufgabenstellung ermitteln. Entweder ist die Stoffmenge direkt in mol angegeben oder es kann auf die Stoffmenge der Stoffportion


geschlossen werden (über die molare Masse des Stoffs oder bei Gasen über das molare Volumen)

Schritt 4: Über die Koeffizientenverhältnisse auf die Stoffmengen des/der gesuchten Stoff(e) (in mol) schließen.

Schritt 5: Evtl. noch in die gesuchte Größe, z.B. Masse oder Gasvolumen, umrechnen. Dafür braucht man häufig die molare Masse oder das molare Volumen.

a)	$2 \text{ Na}_2\text{O}_2$		\rightarrow	$2 \text{ Na}_2\text{O}$	+	O_2		
	1 mol			1 mol		0,5 mol		
b)	2 NaHCO_3		\rightarrow	Na_2CO_3	+	CO_2	+	H_2O
	1 mol			0,5 mol		0,5 mol		0,5 mol
c)	N_2O	+	3 H_2	\rightarrow	N_2H_4	+	H_2O	
	0,25 mol		0,75 mol		0,25 mol		0,25 mol	
d)	Cu_2S	+	$2 \text{ Cu}_2\text{O}$	\rightarrow	SO_2	+	6 Cu	
	0,15 mol		0,3 mol		0,15 mol		0,9 mol	
e)	$2 \text{ H}_2\text{O}$	+	CO_2	\rightarrow	CH_4	+	2 O_2	
	0,654 mol		0,327 mol		0,327 mol		0,654 mol	
f)	Al_4C_3	+	$12 \text{ H}_2\text{O}$	\rightarrow	4 Al(OH)_3	+	3 CH_4	
	0,095833 mol		1,15 mol		0,3833 mol		0,2875 mol	

Man beachte! Die Stoffmenge bleibt während einer chemischen Reaktion nicht unbedingt konstant! So entstehen z.B. bei c) aus 4 Ausgangsstoffmolekülen 2 Produktmoleküle. Aus 1 mol (0,25 mol + 0,75 mol) Ausgangsstoffen entstehen insgesamt 0,5 mol Produkte!



Die Gesamtmasse bleibt bei chemischen Reaktionen erhalten, die Stoffmenge bzw. Teilchenzahl kann sich ändern!

Aus Vergleich der Koeffizienten folgt:

Für jedes verbrauchte Na entsteht 1 NaCl-Formeleinheit (folgt aus Koeffizientenverhältnis 2:2).



a) Umrechnung von $m(\text{NaCl})$ in $n(\text{NaCl})$

$$M(\text{NaCl}) = \frac{m(\text{NaCl})}{n(\text{NaCl})} \Rightarrow n(\text{NaCl}) = \frac{m(\text{NaCl})}{M(\text{NaCl})}$$

$$M(\text{NaCl}) = 58,44 \frac{\text{g}}{\text{mol}} \quad (\text{Wert mit des PSE berechnet})$$

$$n(\text{NaCl}) = \frac{10\text{g}}{58,44\text{g}} = 0,1711\text{mol}$$

b) Ermittlung der Stoffmengen und der Masse Natrium Na (anhand Koeffizienten der Reaktionsgleichung)

Pro verbrauchtes mol Na entsteht 1 mol NaCl. Dies ergibt sich durch Vergleich der Koeffizienten:

$2\text{Na} + \text{Cl}_2 \rightarrow 2\text{NaCl}$. Da 0,1711 mol NaCl herzustellen sind müssen $n(\text{Na}) = 0,1711$ mol Na eingesetzt werden.

Umrechnung in $m(\text{Na})$

$$m(\text{Na}) = M(\text{Na}) \cdot n(\text{Na})$$

$$M(\text{Na}) = 22,99 \frac{\text{g}}{\text{mol}} \quad (\text{Wert aus PSE})$$

$$m(\text{Na}) = 22,99 \frac{\text{g}}{\text{mol}} \cdot 0,1711 \text{ mol} \approx 3,93 \text{ g}$$

c) Ermittlung der Stoffmenge Cl_2 und Umrechnung in das Volumen $V(\text{Cl}_2)$

Er wird die **halbe** Stoffmenge verbraucht, wie Stoffmenge NaCl entsteht. Dies ergibt sich durch Vergleich der Koeffizienten: $2\text{Na} + 1\text{Cl}_2 \rightarrow 2\text{NaCl}$. Da 0,1711 mol NaCl herzustellen sind, müssen $n(\text{Cl}_2) = 0,1711 \text{ mol} : 2 = 0,08555$ mol Cl_2 eingesetzt werden.

Bei Gasen wird üblicherweise das benötigte Volumen angegeben und nicht die benötigte Masse wie bei Feststoffen oder Flüssigkeiten. **Allgemein gilt: 1 mol eines beliebigen (idealen) Gases nimmt bei 20 °C und Normaldruck 24,06 L ein.**

$$\text{Dreisatz} \quad 1 \text{ mol} \quad = 24,06 \text{ L}$$

$$0,08555 \text{ mol} = x \text{ L}$$

$$\frac{x}{24,06} = \frac{0,08555}{1} \Rightarrow x \approx 2,06 \text{ L}$$

b) Auch wenn 12,5% mehr Na eingesetzt werden, entsteht nicht mehr NaCl, da für den Na-Überschuss der Reaktionspartner (Cl_2) fehlt. Stoffe reagieren also nur in festen Massenverhältnissen miteinander!

Nr. 1.3

2. $2 \text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2 \text{H}_2\text{O}$; **Elementare Gase sind in der Regel zweiatomig (bis auf die Edelgase): $\text{O}_2, \text{H}_2, \text{Cl}_2, \text{N}_2, \text{F}_2 \dots$**

a) Berechnung der Stoffmenge H_2O :

Mit der Dichte $\rho \approx 1,0 \text{ g/mL}$ folgt aus $V(\text{H}_2\text{O}) = 50 \text{ mL} \Rightarrow m(\text{H}_2\text{O}) = 50 \text{ g}$

(M(H₂O) = 18,02 g/mol: mit PSE berechnet)

$$n(\text{H}_2\text{O}) = \frac{50\text{g}}{18,02 \frac{\text{g}}{\text{mol}}} \approx 2,778\text{mol}$$

b) Ermittlung der Stoffmengen n(H₂) und Volumenberechnung

Pro mol H₂O wird 1 mol H₂ verbraucht. dies folgt aus dem Koeffizientenverhältnis 2: 2. Mit anderen Worten: Die gleiche Anzahl an H₂O-Molekülen wird gebildet, wie H₂ verbraucht wird. ☹

$$n(\text{H}_2) = 2,778 \text{ mol.}$$

1 mol eines beliebigen (idealen) Gases nehmen wie 20 °C und Normaldruck 24,06 L ein.

Dreisatz $\cdot V(\text{H}_2) = 66,84 \text{ L}$

$$\frac{x}{24,06} = \frac{2,778\text{mol}}{1} \Rightarrow x \approx 66,84\text{L}$$

c) Ermittlung der Stoffmengen n(O₂) und Volumenberechnung

Aus dem Koeffizientenverhältnis 1 : 2 folgt: Es entsteht doppelt so viel H₂O wie O₂ verbraucht wird. Mit anderen Worten: Die verbrauchte O₂-Stoffmenge ist halb so groß, wie die synthetisierte H₂O-Menge.

$$\text{☹ } n(\text{O}_2) = 2,778 \text{ mol} : 2 = 1,389 \text{ mol.}$$

Mit dem Molvolumen (1 mol entspricht 24,06 L) folgt der Dreisatz:

$$1 \text{ mol} = 24,06 \text{ L}$$


$$1,389 \text{ mol} = x \text{ L}$$

$\cdot V(\text{O}_2) = 33,42 \text{ L}$

$$\frac{x}{24,06} = \frac{1,389\text{mol}}{1} \Rightarrow x \approx 33,42\text{L}$$

Man hätte auch schlussfolgern können. Es wird das halbe Volumen O₂ benötigt, wie H₂-Volumen benötigt wird, da das Koeffizientenverhältnis 2 : 1 ist (2 H₂ + 1 O₂ → ...). Also V(O₂) = 66,84 L : 2 = 33,42 L.

Nr. 1.4



a) Berechnung der Stoffmenge CaCO₃:

(M(CaCO₃) = 100,09 g/mol: mit PSE berechnet)

$$n(\text{H}_2\text{O}) = \frac{0,291\text{g}}{100,09 \frac{\text{g}}{\text{mol}}} \approx 0,002907\text{mol}$$

b) Ermittlung der Stoffmengen der Produkte und Umrechnung in Masse bzw. Volumen

Aus den Koeffizientenverhältnissen folgt:

Es entstehen n(CaCl₂) = 0,002907 mol CaCl₂.

$$m(\text{CaCl}_2) = M(\text{CaCl}_2) \cdot n(\text{CaCl}_2)$$

Mit (Wert aus PSE) folgt:

$$M(\text{CaCl}_2) = 110,98 \frac{\text{g}}{\text{mol}}$$

$$m(\text{CaCl}_2) = 110,98 \frac{\text{g}}{\text{mol}} \cdot 0,002907 \text{ mol} \approx 0,323 \text{ g}$$

Es entstehen $n(\text{CO}_2) = 0,002907 \text{ mol CO}_2$. (vgl. Koeffizientenverhältnis)

Mit dem Molvolumen (1 mol \uparrow 24,06 L) folgt der Dreisatz:

$$1 \text{ mol} = 24,06 \text{ L}$$

$$0,002907 \text{ mol} = x \text{ L}$$

$$. V(\text{CO}_2) = 70 \text{ mL}$$

$$\frac{x}{24,06} = \frac{0,002907 \text{ mol}}{1} \Rightarrow x \approx 0,070 \text{ L} \approx 70 \text{ mL}$$

Es entstehen $n(\text{H}_2\text{O}) = 0,002907 \text{ mol H}_2\text{O}$. (vgl. Koeffizientenverhältnis)


$$m(\text{H}_2\text{O}) = M(\text{H}_2\text{O}) \cdot n(\text{H}_2\text{O})$$

Mit (Wert aus PSE) folgt:

$$M(\text{H}_2\text{O}) = 18,02 \frac{\text{g}}{\text{mol}}$$

$$m(\text{H}_2\text{O}) = 18,02 \frac{\text{g}}{\text{mol}} \cdot 0,002907 \text{ mol} \approx 0,052 \text{ g}$$

Nr. 1.5



a) Berechnung der Stoffmenge FeS


$$n(\text{FeS}) = \frac{m(\text{FeS})}{M(\text{FeS})} \Rightarrow n(\text{FeS}) = \frac{20 \text{ g}}{87,913 \frac{\text{g}}{\text{mol}}} \approx 0,227 \text{ mol}$$

b) Berechnung der Masse S

$$m(\text{S}) = M(\text{S}) \cdot n(\text{S}) \Rightarrow m(\text{S}) = 32,066 \frac{\text{g}}{\text{mol}} \cdot 0,227 \text{ mol} \approx 7,29 \text{ g}$$

Nr. 1.6

Reaktionsgleichung:



Auch wenn ein Überschuss an CO_2 eingesetzt wird, so ist doch die $\text{Ba}(\text{OH})_2$ -Masse der limitierende Faktor. Der Überschuss an CO_2 ist nach der Reaktion unverändert vorhanden.

$$n(\text{Ba}(\text{OH})_2) = \frac{m(\text{Ba}(\text{OH})_2)}{M(\text{Ba}(\text{OH})_2)} \Rightarrow n(\text{Ba}(\text{OH})_2) = \frac{10 \text{ g}}{171,342 \frac{\text{g}}{\text{mol}}} = 0,0584 \text{ mol}$$

Aus dem 1:1-Koeffizientenverhältnissen folgt:

$$m(\text{BaCO}_3) = n(\text{BaCO}_3) \cdot M(\text{BaCO}_3) \Rightarrow m(\text{BaCO}_3) = 0,0584 \text{ mol} \cdot 197,336 \frac{\text{g}}{\text{mol}} \approx 11,51 \text{ g}$$

Nr. 1.7

Zusammenfassung:

	$2 \text{ N}_2\text{H}_4$	$+ \text{ N}_2\text{O}_4$	\rightarrow	3 N_2	$+ 4 \text{ H}_2\text{O}$	
Stoffmenge	31,206 mol	15,603 mol		46,809 mol	62,413 mol	
Masse	1000 g			1435,7 g	1311,3 g	1124,4 g

a) Berechnung der Stoffmenge Hydrazin


$$n(\text{N}_2\text{H}_4) = \frac{m(\text{N}_2\text{H}_4)}{M(\text{N}_2\text{H}_4)} \Rightarrow n(\text{N}_2\text{H}_4) = \frac{1000 \text{ g}}{32,045 \frac{\text{g}}{\text{mol}}} = 31,206 \text{ mol}$$

b) Berechnung der Masse an Stickstoff

Aus dem Koeffizientenverhältnis folgt: Für 2 mol Hydrazin entstehen 3 mol Stickstoff. Es entsteht also die $3/2 = 1,5$ fache Menge N_2 wie N_2H_4 verbraucht wird.

$$n(\text{N}_2) = n(\text{N}_2\text{H}_4) \cdot 1,5 = 31,206 \text{ mol} \cdot 1,5 = 46,809 \text{ mol}$$

Auch über ausgeschriebenen Dreisatz:



$$31,206 \text{ mol} \leftrightarrow x$$

$$\frac{x}{31,206 \text{ mol}} = \frac{3 \text{ mol}}{2 \text{ mol}} \Rightarrow x = \frac{3 \text{ mol}}{2 \text{ mol}} \cdot 31,206 \text{ mol} = 46,809 \text{ mol}$$

$$m(\text{N}_2) = n(\text{N}_2) \cdot M(\text{N}_2) \Rightarrow m(\text{N}_2) = 46,809 \text{ mol} \cdot 28,014 \frac{\text{g}}{\text{mol}} \approx 1311 \text{ g}$$


c) Berechnung der Masse an H_2O

Aus dem 2:4-Koeffizientenverhältnis folgt: Es entsteht die doppelte Menge H_2O wie N_2H_4 verbraucht wird. $\bullet n(\text{H}_2\text{O}) = 2 \cdot 31,206 \text{ mol} = 62,412 \text{ mol}$

$$m(\text{H}_2\text{O}) = M(\text{H}_2\text{O}) \cdot n(\text{H}_2\text{O}) = 18,02 \frac{\text{g}}{\text{mol}} \cdot 62,412 \text{ mol} \approx 1125 \text{ g}$$

Berechnung des Massenverhältnisses

Das Stoffmengenverhältnis ergibt sich aus der Reaktionsgleichung und beträgt **2: 1**:





2 mol Hydrazin reagieren mit 1 mol Distickstofftetraoxid: Dieses Stoffmengenverhältnis kann in ein Massenverhältnis umgerechnet werden:

$$m(N_2H_4) = n(N_2H_4) \cdot M(N_2H_4) \Rightarrow m(N_2H_4) = 2 \text{ mol} \cdot 32,05 \frac{\text{g}}{\text{mol}} = 64,10 \text{ g}$$


$$m(N_2O_4) = n(N_2O_4) \cdot M(N_2O_4) \Rightarrow m(N_2O_4) = 1 \text{ mol} \cdot 92,01 \frac{\text{g}}{\text{mol}} = 92,01 \text{ g}$$

Das Massenverhältnis beträgt $N_2H_4: N_2O_4 = 64,10 \text{ g} : 92,01 \text{ g}$, oder runtergerechnet $N_2H_4: N_2O_4 = 1 \text{ g} : 1,43 \text{ g}$

2.1




2.2



b) Die Reaktion wird durch die Verwendung eines Katalysators beschleunigt, d.h. bei gleich bleibender Temperatur läuft die Rkt. schneller ab. Der Katalysator senkt die Aktivierungsenergie (E_a) herab. Durch die Herabsenkung dieser energetischen Barriere, können mehr Eduktteilchen pro Zeiteinheit reagieren.

c) selber Lösen! Erst Reaktionsgleichung aufstellen. „Verbrennung an der Luft“ ☹️ exotherme Reaktion durch Reaktion mit Sauerstoff (O_2).

2.3




Stoffmenge 0,454 mol 0,454 mol

Masse 20 g 62,807 g

Hinweis: $M(\text{K}_2\text{CO}_3) = 138,1965 \text{ g/mol}$; $M(\text{CO}_2) = 44,0095 \text{ g/mol}$

2.4

Schritt 1: Alle Ausgangsstoffe und Produkte der Reaktion durch ein Pfeil getrennt notieren



Schritt 2: Reaktionsgleichung einrichten



Schritt 3: Gegebene Stoffmenge aus der Aufgabenstellung ermitteln


$$M(\text{Fe}_2\text{O}_3) = 2 \cdot M(\text{Fe}) + 3 \cdot M(\text{O}) = 159,6882 \text{ g/mol}$$

(kann alternativ auch über Dreisatz berechnet

$$n(\text{Fe}_2\text{O}_3) = \frac{m(\text{Fe}_2\text{O}_3)}{M(\text{Fe}_2\text{O}_3)} = \frac{50 \text{ g}}{159,6882 \frac{\text{g}}{\text{mol}}} \approx 0,31311 \text{ mol}$$

werden)

Schritt 4: Über die Koeffizientenverhältnisse auf die Stoffmengen des/der gesuchten Stoff(e) (in mol) schließen.



Wegen dem 3:2 –Verhältnis folgt: Die Stoffmenge an O_2 bei der Reaktion ist 1,5 mal (3:2 = 1,5) so groß wie die Fe_2O_3 -Stoffmenge. $\Rightarrow n(\text{O}_2) = 1,5 \cdot 0,31311 \text{ mol} \approx 0,469665 \text{ mol}$

O_2 . Dies kann formal auch mit einem Dreisatz berechnet werden:


Koeffizient 2 \leftrightarrow 0,31311 mol	}	$x \approx 0,469665 \text{ mol O}_2$
Koeffizient 3 \leftrightarrow x mol		

Schritt 5: Evtl. noch in die gesuchte Größe, z.B. Masse oder Gasvolumen, umrechnen.

$$M(\text{O}_2) = 2 \cdot M(\text{O}) = 31,9988 \text{ g/mol}$$

$$m(\text{O}_2) = n(\text{O}_2) \cdot M(\text{O}_2) = 0,469665 \text{ mol} \cdot 31,9988 \text{ g/mol} \approx \underline{\underline{15,03 \text{ g O}_2}}$$

2.5



$$n(\text{C}_3\text{H}_8) = \frac{m(\text{C}_3\text{H}_8)}{M(\text{C}_3\text{H}_8)} = \frac{170 \text{ g}}{44,09562 \frac{\text{g}}{\text{mol}}} \approx 3,85526 \text{ mol C}_3\text{H}_8$$

$$n(\text{C}_3\text{H}_8) = \frac{m(\text{C}_3\text{H}_8)}{M(\text{C}_3\text{H}_8)} = \frac{170 \text{ g}}{44,09562 \frac{\text{g}}{\text{mol}}} \approx 3,85526 \text{ mol C}_3\text{H}_8$$


Wegen dem Koeffizientenverhältnis von 1:3 ($\underline{1} \text{ C}_3\text{H}_8 + 5 \text{ O}_2 \rightarrow \underline{3} \text{ CO}_2 + 4 \text{ H}_2\text{O}$) wird die dreifache Stoffmenge an CO_2 gebildet: $n(\text{CO}_2) = 3 \cdot 3,85526 \text{ mol} \approx 11,56577 \text{ mol CO}_2$. Mit Hilfe

der Molaren Masse von $M = 44,0095 \text{ g/mol}$ kann man dies in die Masse von ca. $m \approx 509 \text{ g CO}_2$ umgerechnet werden.

Wegen dem Koeffizientenverhältnis von 1:4 ($\underline{1} \text{ C}_3\text{H}_8 + 5 \text{ O}_2 \rightarrow 3 \text{ CO}_2 + \underline{4} \text{ H}_2\text{O}$) wird die vierfache Stoffmenge an H_2O gebildet: $n(\text{H}_2\text{O}) = 4 \cdot 3,85526 \text{ mol} \approx 15,42103 \text{ mol H}_2\text{O}$. Das sind ca.


$$\underline{m(\text{H}_2\text{O}) \approx 278 \text{ g H}_2\text{O}}$$

2.6




500 g $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$ entsprechen 2,775374 mol (da $M = 180,15588 \text{ g/mol}$). D.h. es entstehen 16,652246 mol CO_2 . Wenn 1 mol 22,4 L einnimmt (vgl. Aufgabenstellung), dann nehmen 16,652246 mol ca. 373 L ein.

2.7



5 g Kohlenstoff entsprechen $n = 0,416295 \text{ mol}$. Es entstehen 0,416295 mol CO und 0,416295 mol H_2 . Insgesamt entstehen also 0,8325909397 mol Gas. Diese nehmen ein Volumen von ca. 74 L ein.

2.8



$$n(\text{FeS}_2) = \frac{5 \text{ g}}{119,977 \text{ g/mol}} \approx 0,04167465 \text{ mol}$$


Wegen dem 4:2-Verhältnis ist die Fe_2O_3 -Stoffmenge gerade halb so groß: $n(\text{Fe}_2\text{O}_3) = 0,02083733 \text{ mol}$. $m(\text{Fe}_2\text{O}_3) = n(\text{Fe}_2\text{O}_3) \cdot M(\text{Fe}_2\text{O}_3) = 0,02083733 \cdot 159,6882 \text{ g/mol} \approx \underline{\underline{3,33 \text{ g}}}$

Fe_2O_3

Wegen dem 4:11-Verhältnis ist die verbrauchte Stoffmenge 11/4 mal (= 2,75 mal) größer als die FeS_2 -Stoffmenge:

$n(\text{O}_2) = 0,114605 \text{ mol}$. Diese nehmen ein Volumen von $\underline{\underline{3,26 \text{ L}}}$ ein (da $V_m = 28,45 \text{ L pro mol}$ beträgt).

2.9



10 Gramm Al entsprechen einer Stoffmenge von $n = 0,3706 \text{ mol}$.

Wegen dem Koeffizientenverhältnis (2:3) folgt, dass für die vollständige Abreaktion des Al, die Br_2 -Stoffmenge von $n(\text{Br}_2) = 0,5559 \text{ mol}$ benötigt wird. *Ist diese Brom-Stoffmenge überhaupt vorhanden?* => 10 mL Brom (Br_2) wiegen **31,2** Gramm. Sie entsprechen einer Stoffmenge von $n(\text{Br}_2) = 0,195 \text{ mol}$. Das ist also viel **weniger** als die benötigte Stoffmenge.

=> **Überschüssiger Stoff: Al** **Mangelnder Stoff: Br_2**


b) Die vorhandene Stoffmenge Brom (0,195 mol) können wegen dem 2:3-Koeffizientenverhältnis mit $n(\text{Al}) = 0,1301 \text{ mol}$ Al reagieren. Das sind **3,511 g** Al. Der Rest des Aluminiums bleibt erhalten und kann nicht abreaktieren. Es bleiben also 6,49 g Al übrig. Alle anderen Massen (3,51g Al und 31,2 g Br_2) wurden zu AlBr_3 umgesetzt. Nach Reaktionsende ist also $m(\text{AlBr}_3) \approx 34,71 \text{ g}$ enthalten.

2.10

Rkt. Gleichung	CH_4	+	2 O_2	\rightarrow	1 CO_2	+	$2 \text{ H}_2\text{O}$	
In	10 L		5 L		?		?	
Aufgabenstellung gegebene Stoffportion								
Vorgelegte Stoffmengen	0,446429 mol		0,223214 mol					Mit Dreisatz berechnet. z.B. für CH_4 1 mol ~ 22,4 L x ~ 10 L
<p>Als nächstes muss überprüft werden, ob und wenn ja, welche der Ausgangsstoffe im Überschuss vorliegen. Da die Ausgangsstoffe im Stoffmengenverhältnis 1:2 reagieren (Koeffizientenverhältnis der Rkt.gleichung) erkennt man, dass ein Überschuss an CH_4 enthalten ist, denn 0,223214 mol O_2 benötigen nur halb so viel CH_4, also 0,111607 mol CH_4. Die O_2-Portion hingegen kann vollständig abreaktieren. =></p>								
tatsächlich reagierende Stoffmengen und Stoffmengen der sich bildenden Produkte.	0,111607 mol		0,223214 mol		0,111607 mol		0,223214 mol	
nach vorhandene Stoffmengen	Rkt. 0,33482 mol		0,00 mol		0,111607 mol mol		0,223214 mol	
Umrechnung Volumina	in 7,50 L		0,00 L		2,50 L		5,00 L	Mit Dreisatz berechnet. z.B. für CH_4 1 mol ~ 22,4 L Mit Dreisatz berechnet. z.B. für CH_4 : 1 mol ~ 22,4 L 0,33482 mol ~ x

Molare Massen aus PSE	–	16,043 g/mol	31,9998 g/mol	44,010 g/mol	18,0152 g/mol
Nach vorhandene Massen (mit $n \cdot M$ berechnet)	Rkt.	5,37 g	0,00 g	4,91 g	4,02 g


Nr. 3.1



b) $M(\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6) = 180,156 \text{ g/mol}$. 1000 g Glucose sind ca. 5,5507 mol. Es muss die 6-fache Stoffmenge CO_2 umgesetzt werden, also ca. 33,304 mol. Das sind ca. 1466 g CO_2 .

Es bildet sich die 6-fache Stoffmenge Sauerstoff, wie Glucose gebildet wird, also 33,304 mol. Da 1 mol 23,5 Liter einnimmt, nimmt diese Stoffportion ca. 783 Liter ein.

Nr. 3.2




20 g AlCl_3 sind 0,14999295 mol. Es muss dieselbe Stoffmenge Al (0,14999295 mol) und die dreifache Stoffmenge HCl (= 0,44997885 mol) eingesetzt werden. $m(\text{Al}) \approx 4,05 \text{ g}$. $m(\text{HCl}) \approx 16,41 \text{ g}$.

Nr. 3.3

	3 CO	+ Fe ₂ O ₃	→	2 Fe	+ 3 CO ₂
Masse		ca. 1,430 · 10 ⁶ g		10 ⁶ g	
		(ca. 1,43 Tonnen)			
Molare Masse	28,010 $\frac{\text{g}}{\text{mol}}$	159,688 $\frac{\text{g}}{\text{mol}}$		55,845 $\frac{\text{g}}{\text{mol}}$	
Stoffmenge	26860,06 mol	8953,35 mol		17906,71 mol	
Volumen	ca. 601665 L	-		-	
	(ca. 602 Tausend Liter)				

Nr. 3.4



vorhanden sind: $n(\text{I}_2) = \frac{m(\text{I}_2)}{M(\text{I}_2)} = \frac{2 \text{g}}{253,80894 \frac{\text{g}}{\text{mol}}} \approx 0,0078799 \text{ mol}$ und $n(\text{H}_2) = \frac{V(\text{H}_2)}{V_m} = \frac{2 \text{L}}{22,4 \frac{\text{L}}{\text{mol}}} \approx 0,08929 \text{ mol}$

Man erkennt, dass Wasserstoff im Überschuss vorliegt. Der Überschuss beträgt $n_{\text{Rest}}(\text{H}_2) \approx 0,08928 \text{ mol} - 0,0078799 \text{ mol} \approx 0,08141 \text{ mol}$. Diese Stoffmenge an Wasserstoff bleibt bestehen, während das Iod vollständig abreagieren kann. $n_{\text{Rest}}(\text{I}_2) = 0 \text{ mol}$. Wegen des Koeffizientenverhältnisses 1:2

kann man schließen, dass sich doppelt so viel Iodwasserstoff (HI) bildet, wie Iod oder Wasserstoff abreagiert hat. Also $n(\text{HI}) \approx 2 \cdot 0,0078799 \text{ mol} \approx 0,01576 \text{ mol HI}$

Nr. 3.5

Fehlt noch